Chroogomphus mediterraneus, C. cyanescens

Bei den Exkursionen wurden diverse Aufsammlungen von *Chroogomphus*-Arten gemacht. Die Gattung ist erst 2018 von Scambler et al. bearbeitet worden (dazu http://www.pabb.de/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=schluessel_fuer_die_europaeischen_croogomphus.pdf mit weiteren Nachweisen) und beinhaltet 8 Arten, die bei uns vorkommen können.

Am häufigsten vertreten war *C. mediterraneus*. Die Gattung ist mit Nadelbäumen, aber auch mit anderen Schmierröhrlingsarten (z.B. Rhizopogon) vergesellschaftet. Ein Fund von *C. purpurescens* aus Paulinzella wurde leider nicht gesichert, sollte aber wieder gefunden werden. Bei der Bestimmung sollte wegen der Abgrenzung zu *C. britannicus* zusätzlich zur Farbe des Basalmyzels unbedingt auch auf die Sporenmaße geachtet werden.

Chroogomphus mediterraneus
(Funddaten einfügen)
Chroogomphus cyanescens
(Funddaten einfügen)
Auf Grasnarbe in der Mitte eines Waldweges (Picea-Bestand mit eingesteuten Larix)

Nach meiner Erinnerung und Rücksprache mit anderen Exkursionsteilnehmern.